

# CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO DO HOMEM

Recomendações da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIIm) – 2012/2013

VACINAS	ESQUEMAS	COMENTÁRIOS	DISPONIBILIZAÇÃO DAS VACINAS	
			postos públicos de vacinação	clínicas privadas de imunização
Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)	Uma ou duas doses (com intervalo mínimo de 30 dias) para homens nascidos após 1962, de acordo com histórico vacinal, de forma que todos recebam no mínimo duas doses na vida. Dose única para homens nascidos até 1962.	Contraindicada para imunodeprimidos.	SIM	SIM
Hepatites A, B ou A e B	<b>Hepatite A:</b> duas doses, com intervalo de seis meses após a primeira (esquema 0-6 meses).	<ul style="list-style-type: none"> <li>A vacinação combinada contra as hepatites A e B é uma opção e pode substituir a vacinação isolada contra as hepatites A e B.</li> <li>Esquemas especiais de vacinação contra a hepatite B:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>para imunodeprimidos e renais crônicos: dose dobrada (2 mL = 40 mcg) em quatro aplicações (esquema 0-1-2-7 meses);</li> <li>optar por esquema acelerado quando houver urgência na obtenção de proteção contra a hepatite B, com três aplicações iniciais aos 0, 7 e 21 dias, e uma quarta dose após 6 meses.</li> </ol> </li> </ul>	NÃO	SIM
	<b>Hepatite B:</b> três doses – a segunda um mês depois da primeira e a terceira seis meses após a primeira (esquema 0-1-6 meses).		SIM, até 29 anos*	SIM
	<b>Hepatite A e B:</b> três doses – a segunda um mês depois da primeira e a terceira seis meses após a primeira (esquema 0-1-6 meses).		NÃO	SIM
HPV	A vacina quadrivalente contendo os tipos 6, 11, 16 e 18 tem seu uso autorizado e recomendado para meninos e jovens de 9 a 26 anos de idade. Esquema de doses: 0-2-6 meses.	A vacina HPV é indicada para a prevenção de infecções por HPV. A melhor época para vacinar é a da adolescência, entre os 11 e 12 anos de idade.	NÃO	SIM
Vacinas contra difteria, tétano e coqueluche	<b>Com esquema de vacinação básico completo:</b> reforço com dT (dupla do tipo adulto) ou dTpa (tríplice bacteriana acelular do tipo adulto). Reforço a cada dez anos com dT ou dTpa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>O uso da vacina dTpa está especialmente indicado para adultos que convivem ou cuidam de lactentes menores de um ano, visto serem um dos principais transmissores da <i>Bordetella pertussis</i> para esse grupo.</li> <li>Uma dose de vacina dTpa é recomendada, mesmo nos indivíduos que receberam a vacina dupla bacteriana do tipo adulto.</li> <li>Para homens que pretendem viajar para países em que a poliomielite é endêmica, deve-se considerar o uso da vacina dTpa combinada a pólio inativada (dTpa-IPV).</li> </ul>	dT SIM	dT NÃO
	<b>Com esquema de vacinação básico incompleto (que tenha recebido menos de três doses do componente tetânico durante a vida):</b> completar o esquema de três doses, aplicando uma dose de dTpa (tríplice bacteriana acelular do tipo adulto) e uma ou duas doses de dT (dupla bacteriana do tipo adulto) no esquema 0-2-6 meses. Reforço a cada dez anos com dT ou dTpa.		dTpa NÃO	dTpa SIM
Varicela (catapora)	Duas doses com intervalo de um a três meses entre elas.	Indicada apenas para adultos sem história anterior de varicela. Contraindicada para imunodeprimidos.	NÃO	SIM
Influenza (gripe)	Dose única anual.	–	SIM, para grupos de risco	SIM
Meningocócica conjugada ACWY	Dose única.	Considerar, em situações de risco aumentado, dose de reforço para aqueles vacinados há mais de cinco anos. Se a vacina meningocócica conjugada quadrivalente não estiver disponível, a monovalente para o tipo C pode ser empregada, lembrando que esse é o tipo mais comum em nosso país na atualidade.	NÃO	SIM
Febre amarela	Uma dose para residentes ou viajantes para áreas com recomendação da vacina (de acordo com classificação do MS). Se persistir risco, fazer reforços de dez em dez anos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indicada para habitantes de áreas endêmicas de febre amarela e para as pessoas que vão viajar ou se mudar para essas regiões, assim como para atender as exigências sanitárias de determinadas viagens internacionais.</li> <li>Vacina contraindicada para imunodeprimidos, exceto quando os riscos de adquirir a doença superam os riscos potenciais da vacinação.</li> <li>Vacinar pelo menos dez dias antes da viagem.</li> </ul>	SIM	SIM

\* Nos estados da região Norte, a vacina contra hepatite B está disponível para pessoas de até 39 anos de idade.